

Troisième contribution à l'Etude de la flore valaisanne

par René Closuit

Au cours de nos excursions dans le Valais pendant les années 1955 et 1956, nous avons eu la surprise d'observer quelques stations nouvelles de plantes que le « Catalogue de la Flore Valaisanne » de Jaccard ne mentionne pas. Cela nous a incité à faire part de nos observations. Nous y avons ajouté quelques indications relatives à l'altitude et à la répartition de certaines plantes.

Nous suivrons dans cette étude l'ordre et la nomenclature adoptés dans la « Flore de la Suisse » de Binz et Thommen. Les noms de lieux ainsi que les cotes d'altitude sont ceux de la nouvelle carte nationale (feuilles normales 524 Rochers de Naye - W, 545 St-Maurice - E, 565 Martigny - E, 546 Montana - W, 547 Montana - E, 548 Visp - W, 549 Visp - E, et assemblage feuille 272 St-Maurice.

Dryopteris Phegopteris (L.) Christensen : Monthey, Choëx : Les Illettes, 480 m. — Le Petit Clos, 560 m. — Les Epenis, 600 m. — Outre Vièze, 510-525 m.

Dryopteris disjuncta (Rupr.) C. V. Morton : Monthey, Choëx : Le Petit Clos, 560 m.

Dryopteris Robertiana (Hoffm.) Christensen : Vionnaz : Gorge du Torrent de Mayen, 590 m.

Dryopteris austriaca (Jacq.) Woynar Ssp. *spinulosa* (O.F. Müller) Schinz et Thellung : Territoire communal de St-Gingolph : Les Esserts, 440 m. — Le Bouveret, 400-450 m. — Territoire communal de Port Valais : Le Bouveret, 400-450 m. — Monthey, coteau de Choëx : Les Illettes — Vallon de Massongex : Le Biolley, 680 m.

Dryopteris austriaca (Jacq.) Woynar Ssp. *dilatata* Schinz et Thellung : Territoire communal de St-Gingolph : Les Esserts. — Le Bouveret, 400-450 m. — Territoire communal de Port Valais : Le Bouveret, 400-450 m. — Vionnaz : Gorge du Torrent de Mayen — Monthey, Choëx : Les Epenis, 600 m. — Territoire communal de Massongex : forêt de St-Martin — Le Biolley, 680 m.

Polystichum lobatum (Hudson) Chevallier : Les Evouettes.

Asplenium viride Hudson : Le catalogue de Jaccard indique pour cette fougère la cote minimale de 500 m. Or, nous l'avons observée à Port Valais, à la plaine, à l'altitude de 390 m. La limite inférieure de cette plante se trouve abaissée de 110 m.

Asplenium fontanum (L.) Bernh. : Les Evouettes — Montagne de Vionnaz : Béfeu, 579 m. — Territoire communal de Massongex : St-Martin.

Asplenium Trichomanes L. *lusus incisum* Th. Moore : Nous avons observé ce *lusus* peu fréquent aux Evouettes.

Selaginella Selaginoides (L.) Link : Le catalogue de Jaccard indique pour cette plante la cote de 1380-2400 m. Nous l'avons observée sur le territoire communal d'Orsières au-dessus de « Chez les Giroud », à l'altitude de 1230 m. La limite inférieure de cette plante se trouve abaissée de 150 m.

Selaginella helvetica (L.) Link : Territoire communal de Massongex : St-Martin — Territoire communal d'Orsières : au-dessus de « Chez les Giroud », 1240 m. — Agarn — Région de Kastleren — Unter-Ems — Territoire communal de Viège, région du Grauberg.

Milium effusum L. : Territoire communal de Collombey : Muraz.

Stipa capillata L. : Territoire communal de Turtmann : colline de la chapelle de Kastleren, 700 m.

Melica uniflora Retz. : Les Evouettes — Territoire communal de Vionnaz : Vionnaz — Béfeu, 570-580 m. — Gorge du Torrent de Mayen, 500-600 m. — Territoire communal de Collombey : Les Neyres, 600-640 m. — Monthey : Choëx, Outre Vièze, 500 m. — Territoire communal d'Evionnaz : Evionnaz — région de Cadolla, 460-700 m. — région de l'Epignat, 680-800 m. — La Balmaz. — Territoire communal de Collonges : Arbignon, 480-500 m. — Territoire communal de Vernayaz : Miéville — Route de Salvan. — Fully : forêt au-dessous de Tassonières, 480-560 m. — Dorénaz.

Hemerocallis fulva L. : Nous avons observé une colonie de cette plante sur le territoire communal de Martigny-Ville, au Mont Ottan, sur le talus de la route de Salvan.

Allium senescens L. : Nous avons observé cet ail dans la gorge du Mauvoisin, au-dessous de Vérossaz.

Polygonatum verticillatum (L.) All. : Monthey, coteau de Choëx : Les Epenis, 540 m.

Tamus communis L. : Territoire communal de Collombey : Muraz — Collombey, 400-450 m. — Les Neyres, 600-660 m. — Val d'Illiez : Massillon, 600-680 m. — Vers Einsié, 580-640 m. — Chemex, 740 m. — Vallon de Massongex : Le Biolley, 680-720 m. — Le Moulin, 580 m. — St-Martin, 460-600 m. — Vérossaz : Bassays, 760-800 m. — Fully : Branson — Saxé. — Nous avons observé la station déjà signalée dans le vignoble de Leytron. Le catalogue de Jaccard indique que cette plante manque à l'Est de Leytron. Or, nous l'avons observée au Grugnay, au-dessus de Chamoson, à 820 m.

Platanthera chlorantha (Custer) Rehb. : Une colonie de cette orchidée se trouve sur la face S-W du Mont-Chemin, aux Ecoteaux.

Goodyera repens (L.) R. Br. : Nous avons observé cette petite orchidée dans la forêt d'Euzin, au-dessus de Saillon, vers 900 m.

Juglans regia L. : Le Noyer se rencontre souvent à l'état sauvage dans des taillis ou des buissons, parfois même en pleine forêt. Voici les quelques stations que nous avons notées : Au-dessus de Vouvry — Territoire communal de Collombey : Muraz — Massongex : St-Martin — St-Maurice : Vallée du Mauvoisin, Les Cases — Le Bois-Noir — Val St-Barthélemy, La Liardère, 680 m. — Vérossaz : Bassays — Territoire communal d'Evionnaz : La Rasse — Evionnaz — Cadolla, 720 m. — L'Epignat, 740 m. — Les Cornes, 590 m. — Vernayaz : route de Salvan — Mont-Chemin : au-dessus de Martigny, 500-700 m. — Chemin-Dessous, talus de la route, 840 m. — Martigny-Combe : au-dessus du Brocard, 600-700 m. — Fully : Vers l'Eglise, 500-600 m. — Verdan — Saxé — Le Grugnay, au-dessus de Chamoson, 740-770 m. — Sion : coteau de Maragenaz — Château de Vex — Corin, 715-730 m. — Val d'Anniviers : Les Pontis, 1050 m. — Fang, 1080 m. — Ritinen, au-dessus d'Agarn, 800 m. — Vispताल : Tälwald, 680-800 m. — Vallon du Bächji, pente boisée au-dessous d'Unter Stalden, 700-840 m. — Eyholzwald, 750-900 m. — Territoire communal de Glis : pente boisée au-dessus du lieu dit « Grossen Haus » — Waldmatten — Région de Naters — Bircheggen — Eiholz — Hegdorn.

Cannabis sativa L. : Fully : une colonie de chanvre pousse à l'état spontané dans le village de Saxé, sur le talus de la route.

Viscum album L. : Nous l'avons observé sur *Fraxinus excelsior* L. au-dessus de Monthey, à Choëx, 700 m. et sur *Larix decidua* Miller

dans le Mont-Chemin, au-dessus de Martigny, 540 m., au lieu dit « Les Grandes Planches ».

Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc. : Nous avons observé cette plante à l'état subspontané en quelques endroits : Territoire communal de Massongex : Les Paluds, 407 m. — Evionnaz : gare CFF — Martigny : Pied du Mont-Chemin — Le Courvieux — Saillon.

Polycnemum arvense L. Ssp. *majus* (A. Br.) Briq. : quai de la gare de Susten, 623 m.

Salsola Kali L. : Turtmann — Noës, station abondante et assez étendue sur la digue de la rive gauche du Rhône.

Kochia Scoparia (L.) Schrader forma *trichophylla* hort. : Cette plante se rencontre assez souvent à l'état subspontané en Valais. Voici les stations que nous avons notées : Les Valettes, talus de la route — Fully : Mazeimbroz, sur la digue du torrent — Saillon, talus de la route — Saxon, talus de la route cantonale — Noës, talus de la route cantonale — Susten, talus de la route cantonale — Corin.

Dianthus Armeria L. : Evionnaz, au pied du mont, 450 m. — Territoire communal de Vernayaz : au-dessus de Miéville.

Minuartia laricifolia (L.) Sch. et Thell. : Nous avons observé cette plante de la montagne sur le territoire communal de Bovernier, sur le talus de la route du Clou, à 660 m.

Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl : Le catalogue de Jaccard indique pour cette plante la cote de 800-2200 m. Or, nous l'avons trouvée aux Valettes à 600 m. La limite inférieure de cette plante se trouve abaissée de 200 m.

Moehringia trinervia (L.) Clairv. : Epinassey — Au-dessus d'Evionnaz, 860 m. — Territoire communal de Bovernier : pente N-W du Catogne, 800 m. — Le Clou, 700-900 m. — Les Valettes — Vallée de Champex, Bémont, 780 m. — Val d'Anniviers : Fang, Sampelet, 840-860 m. — Au-dessus d'Agarn : région Ritinen — Unter Asp, 800-900 m.

Lepidium virginicum L. : Le Bouveret, gare CFF, 374 m. — Vouvry, gare CFF, 381 m. — Vionnaz, 392 m. — Collombey, gare CFF, 392 m.

Cardamine impatiens L. : Vallon de Massongex : Le Moulin, 580 m. — La Vorpillère, 599 m. — Evionnaz — Vernayaz : Miéville — Dorénaz, 450-460 m.

Sedum ochroleucum Chaix : Vionnaz — Vallon de Massongex : Le Biolley, 670-700 m. — Vérossaz : Bassays, 760-780 m. — Gorge du Mauvoisin, 500-740 m. — Collonges : Arbignon, 460-480 m. — Les Martenaux, 460-600 m. — Vernayaz — Miéville.

Pyrus communis L. : Territoire communal de Collombey : Muraz — Territoire communal de Monthey : Monthey, 500-540 m. — Coteau de Choëx : Le Petit Clos, 420-490 m. — Les Epenis, 560 m. — Condémine, 680 m. — Collonges : Les Martenaux.

Amelanchier ovalis Medikus : Montagnes de Vionnaz : Béfeu, 579 m. — Gorge du Torrent de Mayen, 537 m.

Mespilus germanica L. : cultivé aux Neyres, dans le Val d'Illiez, sur le territoire communal de Collombey, à 660 m.

Trifolium repens L. *forma phyllantum* Ser. : St-Maurice, 422 m. — Evionnaz, 450 m. — Territoire communal de Martigny-Ville : Mont Ottan — Martigny-Gare, station abondante dans un jardin. Nous avons observé cette forme peu fréquente dans la plaine du Rhône vaudoise, sur la face S-E de la Colline de Chiètres, près de Bex, mais elle est très peu abondante dans cette station.

Vicia tetrasperma (L.) Schreber : route du Clou, au-dessus de Bovernier, 740 m.

Vicia dumetorum L. : Territoire communal de St-Gingolph : Vignoles, 500 m. — Territoire communal de Vouvry : Barnex, 400 m. — Dorénaz, au pied du mont, 450-460 m.

Vicia silvatica L. : Territoire communal de Vouvry : Plan du Chêne, 720 m.

Euphorbia dulcis L. : Mont-Chemin, au-dessus de Martigny — Montagnon, au-dessus de Leytron, 760-780 m. — Le Grugnay, au-dessus de Chamoson, 760-800 m.

Euphorbia amygdaloides L. : Territoire communal de St-Maurice : Vérolliez, 420 m.

Euphorbia falcata L. : Vignoble de Loèche, 860 m.

Euphorbia exigua L. : Montagnon, au-dessus de Leytron, 760 m.

Acer Opalus Miller : Les Evouettes, 400-500 m. — Vionnaz, 400-500 m. — Territoire communal de Collombey : Muraz, 420-500 m. — Territoire communal de Troistorrent, Val d'Illiez : Pro Péra, 730 m. — Monthey : Choëx, Les Epenis — St-Maurice : Epinassey — La Liardère, 460-800 m. — Forêt d'Euzin, au-dessus de Saillon — Montagnon, au-dessus de Leytron — Le Grugnay, au-dessus de Chamoson.

Acer Pseudoplatanus L. : Territoire communal de Port-Valais : Le Bouveret — Les Evouettes — Vionnaz — Monthey : Choëx, Outre Vièze — St-Maurice : Le Bois Noir — Val St-Barthélemy — Evionnaz : région de Cadolla — L'Epignat — Territoire communal de Bovernier : pente N-W du Catogne — Les Valettes — Mont-Chemin, au-dessus de Martigny — Fully : Branson — Tassonnière — Vers l'Eglise — Chippis.

Acer platanoides L. : St-Maurice : route de Mex — Val St-Barthélemy — Mont-Chemin : pente W, au-dessus de Martigny-Bourg — Les Ecoteaux — Route forestière du Planard — Les Valettes — Orsières — Martigny-Combe : colline de St-Jean — Fully : Saxé — Maseimbroz.

Impatiens Noli-tangere L. : Monthey : Choëx, Les Ilettes — Vallon de Massongex : Fontany, 502 m. — Evionnaz : région de Cadolla — L'Epignat.

Vitis vinifera L. : Nous avons observé la vigne à l'état sauvage ou à l'état subspontané en quelques endroits dans des buissons, des taillis ou parfois en pleine forêt ; voici les stations que nous avons notées : Fully : Verdan — Territoire communal de Leytron : Produit — Ravoire — Loèche : sur le talus de la route de Loèche-les-Bains, dans des buissons — Vispताल : Tälwald.

Daphne Laureola L. : Vionnaz : Béfeu, 579 m. — Gorge du Torrent de Mayen, 500-620 m. — Le chêne, 766 m.

Sanicula europaea L. : Le catalogue de Jaccard mentionne que cette plante n'a pas été observée au-delà de Sierre. Nous l'avons trouvée à Ritinen, au-dessus d'Agarn, à 800 m.

Seseli annuum L. : Nous avons observé cette plante au-dessus de Collombey, à 420 m.

Monotropa Hypopitys L. : Tälwald, au-dessus de Viège, 1100-1200 m.

Calluna vulgaris (L.) Hull var. *glabra* Neilr. subvar. *albiflora* Hort. : Val d'Illiez : Chemex, 760 m.

Buddleja Davidii Franchet : Nous avons observé assez fréquemment cet arbuste, souvent cultivé, à l'état sauvage, même parfaitement naturalisé, surtout dans le Valais inférieur. Voici les stations que nous avons notées : St-Gingolph : Le Fenalet, 380 m. — Territoire communal de Port Valais : Le Bouveret, 390 m. — Port Valais, 380 m. — Territoire communal de Vouvry : Barnex, 380 m. — La Porte du Sex, 380 m. — Vionnaz : digues de l'Avançon, 400 m. — Collombey : Muraz, 390-410 m. — Collombey, 410-420 m. — Les Neyres, 660 m. — Monthey : Choëx, carrière des Ilettes, 480 m. — Monthey, 420-480 m. — Vallon de Massongex : Champ Bovey, 430 m. — Collonges : Arbignon, sur les digues de l'Aboyeu, 480-510 m. — Les Martenaux, 460-500 m. — Dorénaz : Le Rosel, 460-480 m. — Vernayaz : éboulis de la Pissevache, 460 m. — Territoire communal de Martigny-Ville : Mont-Ravoire, sur le talus de la route au-dessus de La Bâtiaz, 490 m. — Les Prises, 459 m. — Les Vorziers, 465 m. — Fully : vignoble de Tassonières, 500 m. — Verdan, 470-480 m.

Gentiana ciliata L. var. *multiflora* Gaudin : Nous avons observé cette variété dans la gorge du Torrent de Mayen, au-dessus de Vionnaz, à 580 m.

Gentiana ciliata L. : Territoire communal de Vionnaz : gorge du Torrent de Mayen, 560-600 m. — Gorge de la Greffa, 600-700 m. — Béfeu, 579 m. — Le Chêne, 766 m. — Unter Pfinwald.

Teucrium Scorodonia L. : Vouvry — Vionnaz : gorge du Torrent de Mayen — Gorge de La Greffa — Collombey : Muraz — Les Neyres, 600-660 m. — Monthey.

Marrubium vulgare L. : Agarn.

*Leonurus Cardiac*a L. : Charrat — Agarn.

Stachys alpina L. : Territoire communal de St-Gingolph : Les Esserts, 460 m.

Melissa officinalis L. : Nous avons observé cette plante à l'état subspontané à l'Epignat, au-dessus d'Evionnaz, à 720 m.

Sambucus racemosa L. : Cet arbre descend en plaine, à Vionnaz, sur les rives de l'Avançon, à 400 m.

Campanula cochleariifolia Lam. : Cette campanule de montagne descend en plaine à Vionnaz, au bord de l'Avançon, à 400 m. — à Collonges, en Arbignon, au bord de l'Aboyeu, à 460-515 m. — en amont de Bovernier, sur le talus de la route, à 630 m.

Solidago gigantea Aiton var. *leiophylla* Fernald : La Porte du Sex, 381 m. — Val d'Illiez : Cheseaux, 671 m.

Aster Tradescanti L. : Territoire communal de Port Valais : Le Bouveret.

Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pavon Ssp. *hispida* (DC.) Thell. : Vionnaz, 392 m. — Collombey : Muraz, 400-420 m. — Monthey, gare CFF, 406 m. — St-Maurice — Dorénaz, 450 m. — Martigny — Sion, gare CFF, 491 m. — Leukergrund : Susten — Gampinen, 620-630 m. — Agarn — Gamsen — Enerholz, au-dessus de Glis.

Artemisia Verlotorum Lamotte : Saillon, Les Moilles, 466 m.

Scorzonera austriaca Willd. : Val d'Anniviers, au-dessus de Chippis — Turtmann : Kastleren, colline de la chapelle — Unter Pfinwald — Viège : Tälwald, 770 m. — Eyholzwald, 860 m.

Lactuca Serriola L. : Vouvry — Collombey — Monthey — Massongex : Les Paluds — Collonges.

Nous espérons que ces quelques indications contribueront à mieux faire connaître la richesse de la flore valaisanne.

Martigny, le 16 septembre 1956.